

N-KONTROL 50 WP

Suda Islanabilir Toz (WP)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

GRUP	1A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------------	-----------	---------------------------------

Etkili Madde: % 50 Methiocarb - 4-(Metiltiyo)-3,5-il metilkarbamat
Sıçanlarda akut ağızdan LD50 20 mg/kg

Bitki adı	Zararlı Organizma / Hastalık adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
FINDIK	Fındık kurdu	100 g/da- 50 g/100 l su, Ergin	90 gün
	Fındık kokarcası	150 g/100 l su, Ergin, Nimf	90 gün
	Kır tırtılı	150 g/da-75 g/100 l su, Larva	90 gün
	Kızılağaç böceği	150 g/da-75 g/100 l su, Larva,Ergin	90 gün
	Fındık teke böceği	150 g/da-75 g/100 l su, Ergin	90 gün
KARANFİL	Çiçek tripsi	100 g/100 l su, Nimf, Ergin	
ŞEKER PANCARI	Toprak altı zararlıları	900 g/ 100 kg tohum	

İlacın Hazırlanması ve Kullanımı

Gerekli miktar ilaç önce az bir miktar su içerisinde bulamaç haline getirildikten sonra, gerekli miktar su ilave edilerek karıştırılır. Mesurol sistemik olmadığı için, bitkinin her tarafının çok iyi ilaçlanması gerekir. İlaçlamalar rüzgarsız, serin ve sakın zamanlarda yapılmalıdır.

Hassas meyve çeşitlerinde, diğer bütün karbamat bileşimli ilaçlar gibi meyve seyreltmesine neden olabilir. Bu bakımdan ağaçlar çiçek devresinde iken uygulanmamalıdır.

Karışabilirlik Durumu

Mesurool bütün insektisit ve fungusitlerle karıştırılabilir. Ancak alkali reaksiyon gösteren ilaçlarla yapılan karışımlar hemen kullanılmalıdır.

Antidotu ve Tedavisi

Atropin sülfat-Pam'dır.

Doktor'a tavsiye: Zehirlenmenin şiddetine göre Atropin sülfat 2-3 mg'dan başlanarak 100 mg'a kadar verilebilir. Belirti şiddetine göre tedavi uygulanır.